



PROTII : STEFANINI ROMANIA CIRCLE - NR. COILF.

Nume : Cozma . Alexandrina Liliana Nr. reg: 1962718

Varsta cons: 48 ani 11 luni Trimis de: PANAZAN Ioana

Varsta: 48 ani 11 luni Consultat de: PAVEL DANA MARIA

Cod pacient: 100186527 Data: 09.09.2016 10:33

CNP: -----

## RAPORT MEDICAL

### CT torace +abdomen+pelvis cu substanta de contrast administrata intravenos - RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA

Examinarea toraco-abdomino-pelvina efectuata prin CT nativ si cu substanta de contrast i.v. evidentiaza la o pacienta cu diagnosticul de colangiocarcinom, operata, comparativ cu examinarea CT din 24.06.2016:

#### Etaj toracal:

- fata de examinarea anterioara se noteaza;
- se mentine revarsatul pleural drept cu aceeaasi grosime postero-bazala de 34mm asociind colapsul pulmonar pasiv adiacent;
- nu se regasesc noduli sau micronoduli pulmonari nou aparuti sugestivi pentru determinari secundare;
- adenopatii mediastinale paratraheale drepte de 8mm, precarinara de 10mm, latero-aortice stangi 7mm;adenopatie cu viza oncologica in unghiul cardiofrenic drept de 20/15mm;
- usoara crestere a epansamentului pericardic;
- se regasesc banda de fibroza bazala stanga.

#### CONCLUZII

Fara determinari secundare pulmonare.

A spect stationar pleuro-pulmonar, comparativ cu examinarea anterioara.

#### Etaj abdomino-pelvin:

- cresterea diametrului cranio-caudal al LDH, actual masurand 250mm(fata de 210mm); cresterea dimensionala si numerica a determinarilor secundare hepatice ce ocupa intreg parenchimul hepatic restant(inclusiv segmentul VI care nu era afectat anterior), unele fiind confluate, cea mai mare ramand in segmentul VIII cu diametre actuale de 44/25mm(fata de 24/23mm);
- calea biliara de 4mm cu lumen liber, fara compresii extrinseci; se identifica mici adenopatii perihilare de maxim 7mm, fara efect compresiv;
- adiacent fetei viscerale a segmentului VIII se noteaza prezenta unei mici colectii lichidiene pure, cu pereti proprii fini ce prezinta diametre axiale de 51/34mm-imagistic sugerand biliom;
- confluent spleno-portal, vena porta in hilsi ramuri drepte omogen opacifiate, netrombozate, aspect similar examinarii anterioare;
- splina cu dimensiuni crescute, avand axul lung de 165mm si structura omogena;
- pancreas, glande suprarenale, rinichi, uter, anexe cu aspect CT normal;
- nefrograma si urograma prezente simetric in timpi fiziologici;
- vezica urinara in repletie, pereti subtiri, continut omogen lichidian; ostiumuri ureterale libere;
- cresterea cantitatii lichidului de ascita 8mm loa polul inferior al LDH, minim in spatiul Morison, firida parieto-colica dreapta 10mm, interanse digestive supravezical si in FSD de 42mm;
- aparitia a numeroase determinari secundare de tip litic la nivelul corpurilor vertebrale T2-S1, arcuri costale drepte CII anterior, CVI, CVIII, CXI si stang CIV lateral, cat si la nivelul oaselor bazinului.

Dr. DANA PAVEL  
medic specialist  
radiologie si imagistica medicala  
Cod 011352



# REGINA MARIA

REȚEAUA PRIVATĂ DE SĂNĂTATE

**PROTI :** STEFANINI ROMANIA CIRCLE - NR. CONTR.

**Nume :** Cozma . Alexandrina Liliana **Nr. reg:** 1962718

**Varsta cons:** 48 ani 11 luni **Trimis de:** PANAZAN Ioana

**Varsta:** 48 ani 11 luni **Consultat de:** PAVEL DANA MARIA

**Cod pacient:** 100186527 **Data:** 09.09.2016 10:33

**CNP:** 000000000000000000

## RAPORT MEDICAL

### CONCLUZII

Progresie dimensionala si numeerica a determinarilor secundare hepatice.  
Hepatosplenomegalie;  
Lichid de ascita in cantitate mica/medie.  
Aparitia determinarilor secundare osoase.

DLP=1417mGy xcm

Dr.PAVEL DANA  
Medic specialist Radiologie-Imagistica medicala.

**Diagnostic:** Alte examinari speciale specificate

..